

三、WSO 卒中中心质量评价关键绩效指标

3.1 质量评价数据

1. 卒中时年龄
2. 性别
3. 卒中发病时间（症状出现或最后确认正常的时间）
4. 到达医院的时间（就诊时间）
5. 住院床位类型（NICU、卒中监护床位、卒中普通床位、其他床位）
6. 患者的来源地（家中或发病现场、社区医院、下级卒中中心（已诊断卒中并处置）、院内发病、其他医院）
7. 患者送至医院的交通方式（急救车、私家车、院间转诊）
8. 急救车是否提前通知
9. 既往史：
 - (1) 高血压病史
 - (2) 糖尿病病史
 - (3) 高脂血症病史
 - (4) 近半年内吸烟史
 - (5) 既往急性缺血性脑卒中/短暂性脑缺血发作史
 - (6) 卒中前正在进行抗凝治疗
10. 发病前改良Rankin量表评分
11. 入院时美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分（0-42分或不详）
12. 入院后首次测量的收缩压
13. 入院后首次测量的舒张压
14. 首次脑影像学检查类型：(1) CT；(2) CT+CTA；(3) CT+CTA+CTP；(4) MR；(5) MR+MRA；(6) MR+MRA+MRP；(7)外院检查；(8)未检查
15. 首次脑影像学检查时间
16. 基线ASPECTS评分
17. 缺血性卒中部位：(1)前循环；(2)后循环；(3)前循环和后循环
18. 卒中类型：(1)急性脑梗死；(2)短暂性脑缺血发作（TIA）；(3)脑出血；(4)蛛网膜下腔出血（SAH）；(5)静脉窦血栓形成；(6)类卒中；(7)诊断不明
19. 静脉溶栓治疗
20. 未进行静脉溶栓治疗的原因：（禁忌症；符合指征但患者或家属拒绝；外院溶栓；转其他医院溶栓；其他原因）

21. 静脉溶栓药物（阿替普酶；替奈普酶；尿激酶；其他）
22. 静脉溶栓开始时间
23. 静脉溶栓前静脉降压治疗
24. 机械取栓治疗
25. 机械取栓的动脉穿刺时间
26. 机械取栓术后改良的脑缺血治疗分级（mTICI）：0级、1级、2a级、2b级、2c级、3级
27. 机械取栓术后血管再通时间
28. 再灌注治疗后症状性颅内出血
29. 脑出血静脉降压治疗
30. 脑出血静脉降压治疗开始时间
31. 脑出血抗凝逆转剂治疗
32. 脑出血抗凝逆转剂治疗开始时间
33. 入院时已知或住院期间检测到心房颤动/扑动
34. 卒中后出现严重并发症（包括重症肺炎、呼吸衰竭、菌血症、心肌梗死、急性心功能衰竭、症状性心率失常、消化道出血、急性肾功能衰竭、急性肝功能衰竭、摔倒、肺栓塞等）
35. 缺血性脑卒中病因（大动脉粥样硬化、心源性栓塞、小血管病、隐源性、其他病因）
36. 吞咽功能评估
37. 康复治疗评估
38. 患者出院去向/结局（回家，院内转科，转康复医院，转其他医院，转护理机构，死亡）
39. 出院或死亡日期
40. 出院时NIHSS评分（0-42分）
41. 出院时改良Rankin量表评分（0-6分）
42. 出院处方降压药物
43. 出院处方抗血小板药物
44. 出院处方抗凝药物
45. 出院处方他汀药物
46. 卒中后90天改良Rankin量表评分（0-6分）