

3.2 质量关键绩效指标

1. 静脉溶栓治疗率：_____ % (计算公式：静脉溶栓治疗患者数 ÷ 发病7天内缺血性卒中患者数)
 静脉溶栓时间窗内容栓率：_____ % (计算公式：静脉溶栓治疗患者数 ÷ 症状出现 ≤ 4.5小时内到院的缺血性卒中患者数)
 到院到静脉溶栓开始的时间 (中位数)：_____ 分钟
 到院到静脉溶栓开始的时间 < 60分钟的患者占比：_____ %
 到院到静脉溶栓开始的时间 < 45分钟的患者占比：_____ %
2. 机械取栓治疗率：_____ % (计算公式：机械取栓治疗患者数 ÷ 发病7天内缺血性卒中患者数)
 到院到动脉穿刺的时间 (中位数)：_____ 分钟
 到院到动脉穿刺的时间 < 120分钟的患者占比：_____ %
 到院到动脉穿刺的时间 < 90分钟的患者占比：_____ %
 改良的脑缺血治疗分级 (mTICI) 2b-3级占比：_____ %
 动脉穿刺到血管再通 (mTICI 2b-3级) 时间 (中位数)：_____ 分钟
3. 卒中患者收治于卒中单元率 (计算公式：卒中患者收治于卒中单元数 ÷ 总卒中患者数)：_____ %
4. 再灌注治疗后出现症状性颅内出血的患者比例：_____ %
5. 卒中患者出现严重并发症 (肺炎、跌倒、肺动脉栓塞等) 的比例：_____ %
6. 收缩压高于140mmHg的脑出血患者到院到启动降压治疗的中位时间：_____ 分钟
7. 卒中前口服抗凝药的脑出血患者到院到接受抗凝逆转剂治疗的中位时间：_____ 分钟
8. 非心源性缺血性卒中患者出院时抗血小板药物处方率：_____ %
9. 合并心房颤动的缺血性卒中患者出院时口服抗凝药物处方率：_____ %
10. 合并高血压的卒中患者出院时降压药物处方率：_____ %
11. 肠内营养前完成吞咽功能评估率：_____ %
12. 入院后接受康复治疗 (物理治疗) 评估率：_____ %
13. 出院时改良Rankin量表 (mRS) 相关指标：
 住院期间死亡率：_____ %
 缺血性卒中/短暂性脑缺血发作 (TIA) 所致死亡率：_____ %
 出血性卒中所致死亡率：_____ %
14. 90天改良Rankin量表 (mRS) 相关指标：
 mRS中位数：_____
 mRS 0-1分患者比例：_____ %
 mRS 0-2分患者比例：_____ %
 mRS 6分 (死亡) 患者比例：_____ %